

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

MUNIE A GORGE BRUNE

VINI

Lonchura castaneothorax

Chestnut-breasted Mannikin

Aspect et Couleur

Mâle : passereau brunâtre avec une tête noire, front et calotte grise et gros bec gris. Poitrine brune séparée de l'abdomen blanc par une barre noire épaisse. Croupion et queue bruns dorés. Taille 12 centimètres.

Femelle : plus pâle. Taille 10-11,5 centimètres.

Juvénile : Bec sombre; brun olive dessus, chamois dessous.



Répartition et Abondance



Originaire de Nouvelle-Guinée et d'Australie (Nord et côte orientale jusqu'à Sydney) d'où elle a été introduite en Polynésie française à la fin du 19ème siècle, elle est présente dans tous les archipels et de nombreuses îles.

On la rencontre à Tahiti (répandue), Moorea, Maïao et aux îles sous le vent (Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Maupiti et Mopelia).

Aux Marquises on la trouve dans toutes les îles habitées (Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Iva) et à Motane.

Présent dans toutes les îles habitées des Australes sauf à Rapa.

L'oiseau est plus rare aux Tuamotu où il existe au moins à Makatea.

Habitat et Nourriture

la munie fréquente les jardins, les prairies, les pentes des collines à fougères des îles hautes et les zones sèches et en friches (cocoteraies et feo). On la rencontre jusqu'à 700-800 m d'altitude

Elle se nourrit des graines de graminées herbacées (*Melinis*) qu'il attrape avec ses pattes et cueille avec son bec.

Comportement

Cri clair comme "teet ou tit" en contact.

Chant : Longue phrase (12 secondes) de quatre segments espacés : clics, notes dures en deux séries, sifflement à la fin.

Se rassemble en grandes bandes de parfois plus de 50 individus.

Reproduction

Nid volumineux, ovale, avec une entrée latérale, composé d'herbes sèches entrelacées, et garni de brins plus fins ; placé dans un buisson bas, dans une grande touffe d'herbe, ou parmi les mauvaises herbes en croissance.

Les oiseaux se reproduisent d'avril à septembre en Australie et probablement toute l'année en Polynésie française. Le nid est une construction élaborée avec une entrée latérale basse où sont pondus de quatre à huit oeufs blancs.

L'incubation par les deux parents dure 14 jours. Les jeunes s'envolent vers 21 jours.