


L'OISEAU SUR LA BRANCHE

COURLIS D'ALASKA

Kivi, Kiwi (Société, Tuamotu)

Numenius tahitiensis (Gmelin)

Bristle-thighed Curlew



Aspect et Couleur

Taille environ 43 cm.


Gros échassier de couleur brun pale

Poitrine et cou fauve orangé

Le dessus de la tête est foncé

Le bec typique est long et arqué

Queue brune orangée barrée de noir



Répartition et Abondance

Aire de reproduction en Alaska.

Hiverné dans le Pacifique uniquement dans des îles, principalement en Polynésie et en Micronésie.

On le rencontre de septembre à avril dans presque tous les archipels de Polynésie française, mais principalement aux Tuamotu, dans la Société et aux Marquises, rare aux Australes.

Habitat

Il occupe des habitats variés en Polynésie, mais fréquente le plus souvent les récifs, plages et cocoteraies des atolls.

Dans les îles hautes on le rencontre aussi dans les prairies parfois en altitude.

Comportement

Limicole le plus commun après le Chevalier errant et le Pluvier fauve on l'observe fréquemment en troupes d'une dizaine voire d'une centaine d'individus. Il fréquente souvent les motu qui abritent des oiseaux de mer.

Nourriture

Le régime alimentaire comprend principalement des crustacés (bernard l'hermite, crabes), mollusques (nérites, escargots), insectes, scorpions et débris végétaux (algues).

Pour attraper ses proies le courlis fouille activement les interstices du récif de corail et les trous du sol d'où il extrait sa nourriture avec son bec arqué.

Reproduction

En Polynésie on a parfois observé des parades de groupes d'oiseaux.

Les jeunes peuvent estiver pendant une année en Polynésie avant d'entreprendre leur migration de retour vers l'Alaska pour s'y reproduire.