

# L'OISEAU SUR LA BRANCHE

## FOU MASQUÉ

Kena (Tuamotu, Marquises)  
Kariga (Mangareva)

*Sula dactylatra*

Masqued Booby



### Aspect et couleur

Taille : 72 à 86 cm, envergure : 152-170 cm


Poids : 1220-2350 gr, Longévité : 15 ans

Les fous masqués sont majoritairement blanc avec la frange des ailes et la queue noirs. Le masque noir part du bec et couvre les yeux. Le bec est jaune.

Les femelles ont une taille et un poids légèrement supérieurs à ceux des mâles.

Les jeunes fous masqués sont gris avec des parties inférieures blanches. Ils ne ressemblent aux adultes qu'à l'âge de quatre ans.

### Répartition



En Polynésie française, le fou masqué est présent essentiellement aux îles Marquises et dans les Tuamotu de l'est.

L'effectif reproducteur de la Polynésie est modeste avec moins de 700 couples recensés. Les archipels des Tuamotu et des Marquises accueillent l'essentiel des sites, avec notamment des colonies importantes sur les îles Morane et Hatuta'a (plusieurs dizaines de couples). Dans la Société, il niche dans une seule localité et aux Australes la reproduction n'a pas été confirmée. Curieusement, dans les années 1920, il n'avait pas été noté aux îles Marquises.

### Habitat et nourriture

Les fous masqués se nourrissent en plongeant tête la première d'une hauteur qui peut atteindre plus de trente mètres. Les aires de nourrissage sont généralement assez proches du littoral pendant la saison de nidification mais distantes parfois de près de 65 kilomètres des côtes le reste de l'année. Leur régime est composé principalement de poissons et de calamars et les bandes d'oiseaux en quête de nourriture vont souvent de paire avec les bancs de jeunes poissons prédateurs tels que les thons. Les fous masqués sont surtout actifs pendant les heures du jour.

### Comportement et reproduction

Il niche dans des milieux découverts et ventés. Le nid est établi dans des endroits peu accidentés et plutôt plats, dans la partie élevée des plages (côté océan) sur les atolls, sur des plateaux ou de vastes plates-formes recouvertes de végétation sur les îles volcaniques. Aux îles Marquises, on trouve des couples isolés au milieu des colonies de fous bruns. Aux Tuamotu, il niche en petites colonies, les nids étant distants de quelques dizaines de mètres les uns des autres. Etablit au sol un nid de brindilles semblable à celui du fou brun. En Polynésie orientale, la reproduction intervient tout au long de l'année, sans qu'une saison soit bien définie.

