

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

LORI NONNETTE

Vini (Société, Tuamotu)

Vini peruviana

Blue lorikeet




Statut

Espèce *Vulnérable* selon les critères de l'IUCN
Menacées par la prédation des couvées par les rats noirs (*Rattus rattus*)

Aspect et couleur

L'adulte est bleu sombre à l'exception des lores, de la gorge et de la poitrine qui sont blancs immaculés. Bec et pattes orange. L'iris est rouge-orange.
Les jeunes ont la poitrine et la gorge de couleur gris bleu moucheté. Le bec est noir et les pattes sont grises.

Répartition et abondance



Présent sur Rangiroa, Tikehau, Arutua et Kaukura aux Tuamotu et sur Mopelia, Scilly, Bellinghausen aux I.D.V. On estime la population à 2500-3000 individus.

Il se rencontre aussi à Aitutaki aux Îles Cook.

Eteint au début du 20ème siècle à Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora (après 1920), Maupiti, Meetia, Makatea et Niau.

Habitat et nourriture

Cet oiseau fréquente les cocoteraies et les bosquets de kahaia sur les atolls. Sur les îles hautes il devait occuper des milieux plus diversifiés comme il le fait sur Aitutaki où on le rencontre dans les jardins, les plantations et les collines boisées.

L'oiseau se perche dans les branches ou s'accroche aux palmes des cocotiers. Il visite les fleurs dont il se nourrit du nectar qu'il récolte grâce à sa langue râpeuse.



Comportement et reproduction

Le nid est une cavité dans le tronc ou les branches d'un arbre mort qui peut être un cocotier ou un pandanus. Les oiseaux y pondent un ou deux œufs blanc-mat de 19x17mm.

