

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

MARTIN TRISTE

Merle des Moluques (Tahiti)

Komako farani (Hiva Oa)

Mynah

Acridotheres tristis (L.)




Aspect et Couleur

Oiseau de taille moyenne.

Plumage brun noir.

Ailes barrées de blanc.

Bec, oeil et pattes jaunes



Répartition et abondance

Introduit à Tahiti vers 1908. Présent à Moorea

Aux îles sous le vent on le trouve à : Raiatea, Tahaa et Huahine, Scilly, Bellinghausen et Mopelia (absent à Bora Bora et Maupiti).

Aux îles Australes il est présent sur Tubuai et Rurutu .

Aux îles Tuamotu il à été introduit vers 1971 sur les atolls de Hao et Moruroa.

Habitat

Il habite près des habitations, dans les cocoteraies, les plantations et les lisières des forêts secondaires. Il dépasse rarement 400 à 500 m en altitude.

Allure en vol

Souvent observé en bandes de plus de 3 à 10 oiseaux. S'il est capable de coloniser rapidement toute une île, un simple bras de mer suffit à arrêter sa progression.

Chant

Oiseau bruyant au chant parfois sifflé ou composé de cris agressifs ou d'alarme.

Nourriture

Introduit pour chasser les insectes (guêpes) il se nourrit de fruits charnus, de coprah, de larves d'insectes de parasites du bétail et d'ordures ménagères.

Reproduction

Mal connue, se reproduit apparemment toute l'année. Pond de 3 à 5 oeufs de couleur bleu-vert jade dans un nid fait d'une accumulation de matériaux divers.