

# L'OISEAU SUR LA BRANCHE

## MONARQUE DE TAHITI


O'mamao (Tahiti)

*Pomarea nigra*

Tahiti Flycatcher

### Aspect et Couleur

Oiseau de petite taille : 15 cm  
Plumage noir métallique chez l'adulte  
Le jeune est orange chamois  
Bec gris et Pattes gris bleuté



### Espèces voisines

On connaît 4 autres espèces en Polynésie orientale :

*Pomarea dimidiata* à Rarotonga (Iles Cook)

*Pomarea mendozae* à Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa et Motane (Marquises)

*Pomarea iphis* à Ua Huka et Eiao où il est éteint (Marquises)

*Pomarea whitneyi* à Fatu Iva (Marquises)

Il existait une sous espèce éteinte *Pomarea nigra pomarea* à Maupiti (Iles sous le Vent)

### Répartition et abondance

Il est uniquement présent sur l'île de Tahiti (Tahiti Nui) dans quelques vallées de la cote ouest.

Très commun au XIXème siècle, il est devenu extrêmement rare avec un effectif voisin de 20 oiseaux connus en 1998.

### Habitat

Le Monarque de Tahiti est un oiseau essentiellement forestier, mais dont la répartition était autrefois très large (du niveau de la mer jusqu'à 750 à 1500 m et plus). Aujourd'hui il est confiné dans des zones réduites de fond de vallée dont la végétation est à base de mara (*Neonauclea forsteri*).

### Comportement et chant

Les oiseaux défendent très activement un territoire de plusieurs hectares.

Le chant est fort mais mélodieux avec des sonorités métalliques

### Nourriture

Le régime alimentaire est surtout composé de petits insectes et de chenilles qui sont capturés activement dans la végétation arborée.

### Reproduction

Elle est encore mal connue. La nidification commence vers octobre. Elle est terminée en février.

Le nid en forme de coupe est construit en mousse souvent décoré de toiles d'araignées principalement dans des Mara (*Neonauclea forsteri*). L'œuf est incubé pendant 15 à 17 jours et le jeune nourri pendant 3 semaines avant l'envol.