

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

NODDI NOIR OU A FRONT BLANC

Anous minutus Boie


'Oio (Société), Kikiriri (Tuamotu), Parara (Marquises)

Black Noddi


Aspect et couleur

Longueur : 33-36 cm - Envergure : 71cm

Plumage : Sexes semblables. Dessus de la tête blanc. Reste du plumage presque noir. Un croissant blanc au-dessus et au-dessous de l'œil. Queue cunéiforme, légèrement échancrée. A différencier du Noddi brun plus grand et moins sombre.



Répartition géographique



Habite les océans Atlantique et Pacifique.

La forme nominale (*minutus* Boie) niche dans le Pacifique central et sud, depuis les côtes de la Nouvelle-Guinée et du Queensland oriental jusqu'au Groupe Pitcairn.

Il est connu comme nicheur possible ou certain dans 65% des localités visitées.

Présent dans tous les archipels de Polynésie, mais peu abondant dans les îles méridionales (Gambier, Australes), il est même absent de Rapa et Marotiri. L'hétérogénéité de sa répartition dans l'archipel des Tuamotu correspond à une prospection incomplète, ce qui n'est pas le cas dans les îles de Société où le Noddi noir est rare et localisé (Taravao à Tahiti). C'est aux îles Marquises qu'il est le mieux représenté puisqu'il niche dans toutes les localités.

Ecologie et reproduction

En Polynésie, les nids sont toujours établis dans des arbres ou des buissons. S'agissant d'un oiseau colonial, il est fréquent de trouver plusieurs dizaines de nids dans le même arbre, sur la même branche, éloignés de quelques dizaines de cm seulement. Ils sont souvent situés à une hauteur supérieure à 20 mais parfois dans des arbustes à une hauteur rarement inférieure à 1,50 m. Le nid est une petite structure en boule composée de feuilles et de brindilles soudées par les déjections de guano. L'accumulation des matériaux au cours de plusieurs saisons de nidification contribue à augmenter l'importance de l'édifice. Les essences utilisées sont très variées, plus souvent *Pisonia grandis* et *Guettarda speciosa*.



Au sein des colonies, la reproduction est synchronisée, mais on trouve d'importantes différences dans les périodes d'une colonie à l'autre au sein d'un même archipel. Aux îles Marquises, les oiseaux nichent toute l'année, mais l'activité est moins forte au cours de l'hiver austral. Dans les îles de la Société et le nord des Tuamotu la nidification s'étale de novembre à mars. Dans le sud des Tuamotu et aux Gambier, la reproduction a lieu essentiellement de décembre à fin juillet.

Statut et conservation

Statut de conservation UICN : LC : Préoccupation mineure

Tolère le stationnement des humains sous les nids, mais en cas de dérangement il peut y avoir des paniques collectives provoquées par l'envol de quelques-uns, entraînant la chute de pontes ou de jeunes poussins. La prédation des chats se pose dans de nombreuses îles.

Sources : Atlas des oiseaux marins nicheurs, Photo © P. Raust