

# L'OISEAU SUR LA BRANCHE

## PAILLE-EN-QUEUE A BRINS ROUGES

TOAKE (Marquises)  
TAVA'E (Tubuai, Rapa)  
TAVAKE (Mangareva, Tuamotu)  
HOPE KURA (Tuamotu)  
HOPE'UO, MA'UROA (Société)

*Phaeton rubricauda*

Red-tailed Tropicbird

### Aspect et Couleur


Taille : 93 cm

Oiseau paraissant entièrement blanc

La queue est prolongée par  
deux longues plumes rouges

Le bec est rouge vif

Les pattes palmées sont noires



### Répartition et Abondance

Niche dans l'ensemble de la Polynésie Française :

- îles de la Société : Scilly et Mopelia (quelques centaines de couples), Maupiti, Maiao
- Marquises : Hatutu, Motu iti, Fatu Huku (quelques dizaines de couples)
- Tuamotu : Actéons, divers atolls (quelques centaines de couples)
- Australes : Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa (quelques milliers de couples)



### Comportement

Les oiseaux pêchent en mer dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour des colonies.

Certains individus isolés ont pu être observés à mille kilomètres de la colonie la plus proche.

### Habitat et Nourriture

Sur les atolls les colonies sont établies sur les plages tant du côté lagon que du côté mer, dans des endroits dégagés ou sous des buissons.

Sur les îles volcaniques les oiseaux nichent de préférence sur des vives de falaises, mais parfois sur des îlots rocheux ou à l'intérieur des terres.

Le régime alimentaire se compose de céphalopodes (calmars) et de poissons.

### Reproduction

Il niche le plus souvent en colonies lâches où les nids sont séparés de plusieurs mètres mais parfois isolément. Sur les atolls le nid est une simple dépression dans le sable où il apporte parfois quelques végétaux et dans les falaises il niche à même la roche.

Il est probable qu'il se reproduit toute l'année.