

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

PUFFIN DU PACIFIQUE

O'upoa (Moorea et Maupiti),
Kokokoko (Mangareva),

Puffinus pacificus

Wedge-tailed Shearwater



Aspect et couleur

Taille : 42 à 44 cm

Le plus grand puffin nicheur en Polynésie française.
Dessus du corps brun-noir et dessous gris anthracite.
Gorge et tête plus pâles.

Il existe des individus clairs : dessus brun et dessous gris blanc.

Bec caractéristique des puffins : long et effilé, crochu à son extrémité et narines tubulaires.

Pattes de couleur chair. La queue est cunéiforme.

Répartition

Il est présent sur l'ensemble de la Polynésie française où il niche dans les Îles de la Société, aux Tuamotu, aux Marquises et aux Australes. Cet oiseau est abondant dans les régions subtropicales et tropicales de l'Océan Pacifique (Hawaii, Iles Marianne, Caroline, Marshall, Kiribati, Fidji, Tonga, Samoa et Pitcairn) et de l'Océan Indien.

Habitat et nourriture

Oiseau pélagique, le Puffin du Pacifique ne revient à terre que pour se reproduire sur des îles et îlots rocheux. Quelques individus se regroupent alors en fin de journée en attendant de rejoindre leur colonie en début de nuit.

Très bon voilier, il pêche en solitaire, en couple ou en petit groupe loin des côtes (plus de 20 kilomètres). Il capture ses proies en plongeant alors qu'il est en vol ou qu'il nage en surface. Il affectionne les calamars, crustacés et petits poissons.

Comportement et reproduction

En vol, il rase la surface de l'eau en alternant longues phases de vol plané et battements d'ailes de courte durée.

Il niche en colonie dense de septembre à mai (été austral) dans un terrier, qui peut atteindre 2 mètres de profondeur, et plus rarement dans une simple dépression surmontée d'une roche ou d'un buisson.

La femelle pond un seul œuf blanc (de 63 à 69 x 41 à 44 mm) que les deux partenaires du couple couvent. L'œuf est incubé pendant 50 jours. Le petit prend son envol après 70 à 95 jours d'élevage au sol.



Photo : Jean-Claude Thibault