

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

SALANGANE DE TAHITI

Opea

Aerodramus leucophaeus (Peale)

Tahiti Swiftlet

Aspect et Couleur

Taille 10cm, aile 16cm


Oiseau d'aspect entièrement brun-noir

Queue relativement carrée, peu échancrée

Espèces voisines

A. ocistus : abondante aux îles Marquises

A. Sawtelli : salangane d'Atiu aux îles Cook



Répartition et abondance

Elle ne se rencontre que sur les îles de Tahiti (une centaine d'oiseaux) et Moorea en très petit nombre .

Habitat

Elle fréquente les vallées humides, rocheuses et boisées. On l'observe souvent en altitude entre 300 et 800m (ex : route du mont Marau jusqu'à 1000m d'altitude).

Comportement

Son vol est rapide, composé d'un mélange de vol plané et battu, moins papillonnant que celui de l'hirondelle de Tahiti avec laquelle il ne faut pas la confondre.

Le cri est un trille aigu bref, lancé une ou plusieurs fois de suite.

On ne connaît pas de son d'écho-sonar chez la salangane de Tahiti qui niche à l'air libre.

Nourriture

Elle se nourrit vraisemblablement de petits insectes capturés en vol à des altitudes variables au dessus de la forêt ou des lac (Vaihiria).

Reproduction

Elle niche en colonies habituellement composées de quelques couples (5 à 30).

Les nids, faits avec de la mousse, sont construits dans des grottes qui sont de simples dépressions dans un rocher ou sous un surplomb rocheux. Les œufs sont blancs.