

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

STERNE FULIGINEUSE

KAVEKA (Société, Tuamotu)

TARA (Mangareva)

TARAKA (Ua Pou)

TA'A (Hiva Oa, Tahuata)

Sterna fuscata

Sooty tern

Aspect et Couleur

Taille : 43-45 cm

Envergure : 86-94 cm

L'adulte est brun foncé sur le dos et le dessus des ailes. La gorge, poitrine, le ventre et le dessous des ailes sont blancs. Le front est barré d'une large tache blanche qui s'étend jusqu'aux yeux.

Les juvéniles sont presque entièrement gris noir, seul le ventre et le dessous des ailes sont blancs.

Le bec et les pattes sont noirs.



Répartition et Abondance

La sterne fuligineuse est un oiseau répandu dans tous les océans tropicaux.

On l'observe dans l'ensemble de la Polynésie Française :

- îles de la Société : Mopelia, Tetiaroa (quelques centaines de couples);
- Marquises : sur les îles de Ua Pou, Fatu Huku et de Ua Huka, sur les îlots Teuaua et Emeni (plusieurs centaines de milliers de couples);
- Tuamotu : Rangiroa, Tikehau et divers atolls (quelques milliers de couples);
- Australes : Rapa (quelques centaines de couples).

Comportement

Les oiseaux pêchent en mer dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour des colonies et jusqu'à mille kilomètres de la colonie la plus proche. Très grégaires, ils forment des groupes immenses apparaissant parfois à distance comme un nuage de fumée. Ils planent fréquemment haut dans le ciel pour repérer les bancs de poissons ou les autres oiseaux qui pêchent.

Dans les colonies c'est un oiseau extrêmement bruyant au cri : ker-wacky-wack ou kree-a-reek



Habitat et Nourriture

Sur les atolls les colonies sont établies sur les plages tant du côté lagon que du côté mer, dans des endroits dégagés.

Sur les îles volcaniques les oiseaux nichent sur des îlots rocheux ou à l'intérieur des terres.

Le régime alimentaire se compose de céphalopodes (calmars) et de poissons pêchés en rasant la surface plutôt qu'en plongeant.

Reproduction

Elle niche le plus souvent en importantes colonies où les nids sont séparés de quelques dizaines de centimètres (3 à 4 nids au m²).

Sur les atolls le nid est une dépression dans le sable où elle apporte parfois quelques végétaux et dans les îles volcaniques elle niche à même la roche.

Elle pond un œuf blanc taché de marques brunes.