

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

STERNE HUPPEE


Sterna bergii

Tarapapa (Société)

Tara (Tuamotu nord)

Tarara (Gambier)

Great Crested Tern




Aspect et Couleur

Oiseau de bonne taille : 46 cm

Dos et dessus des ailes gris ardoisé

Tête et poitrine blanches avec une crête noire érectile

Bec jaune orangé et tarsi noirs, pattes palmées



Répartition et abondance

C'est un oiseau répandu dans tout le Pacifique sud, jusqu'à l'Indo-Malaisie

En Polynésie orientale, nicheur très localisé dont on connaît une dizaine de sites de nidification (peut être absente de Mururoa).

Observée à quelques occasions aux Îles Marquises. Jamais notée aux Îles Australes ni à Rapa.

Comportement

L'oiseau est observé facilement en vol le long des plans d'eau peu profonds. Il se repose souvent sur les balises des chenaux dans le lagon ou sur des bancs de sable affleurants.

Assez bruyantes dans les colonies, les sternes huppées peuvent être agressives quand on les dérange comme à Tetiaroa.

Nourriture

La sterne huppée pêche dans les eaux peu profondes des lagons, près des récifs barrières et aux embouchures des rivières où elle se nourrit surtout de petits poissons.

On ne l'observe que très rarement à plus de un ou deux kilomètres des côtes.

Reproduction

En Polynésie les colonies sont toujours établies sur des plages de sable avec peu ou pas de végétation sur des îlots d'où chats et rats sont absents.

L'emplacement des colonies est variable d'une année sur l'autre. Elles comptent rarement plus de 100 couples et souvent seulement cinq ou six couples.

Les nids proches les uns des autres se réduisent à une simple dépression dans le sable. Les oiseaux ne pondent qu'un seul œuf entre juillet et janvier dans l'archipel de la Société.