


L'OISEAU SUR LA BRANCHE

TANGARA A DOS ROUGE

VINI (Tahiti)

Ramphocelus dimidiatus

Crimson-Backed Tanager




Aspect et Couleur

Taille : 16 cm

Le male est d'un rouge écarlate au niveau de la poitrine et du ventre, plus sombre sur la tête et le dos. Les ailes et les caudales sont presque noires. La mandibule inférieure est d'un blanc soutenu. Les femelles sont beaucoup moins colorées et d'un rouge plus terne.

Répartition et Abondance



Originaire d'Amérique centrale (Panama, Vénézuela, Colombie) le Tangara fut introduit à Tahiti dans les années 1930-1940.

Il s'est réparti lentement sur l'île. En 1974 il était présent en petit nombre à Punaauia, Paea et Pirae.

En 1986-1991 il occupait toute la côte ouest de Arue à Afaahiti.

Il continue actuellement son extension vers la côte est et la presqu'île.

Habitat et Nourriture

A Tahiti, le Tangara se rencontre dans les jardins et les plantations du littoral qu'il agrémente de sa présence discrète. On ne l'observe jamais en altitude ni en forêt qui est pourtant son habitat d'origine en Amérique.

Il se nourrit de fruits, particulièrement de bananes et de mangues, mais aussi de graines et d'insectes.

Comportement

Il est facilement repéré dans son habitat par son sifflement aigu et métallique. Il se déplace d'arbre en arbre, seul ou en couple, où son plumage éclatant trahit sa présence.

De par son habitat et son alimentation il n'entre pas en compétition avec les espèces endémiques.

Reproduction

On n'a pas de renseignement sur le comportement reproducteur de cet oiseau à Tahiti.