

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

PETREL A COLLIER

Pterodroma brevipes (Peale, 1848)

Pas de nom vernaculaire

Collared Petrel

Aspect et couleur

30cm. Petit Pétrel du groupe Cookilaria.


Le front blanc se fond dans le capuchon gris foncé et les côtés des joues dont les parties supérieures sont grises.

Les parties inférieures sont très variables : elles sont presque totalement blanches chez les morphes pâles ; les morphes intermédiaires ont un collier sombre à travers la poitrine, les morphes sombres ont des parties inférieures gris foncé, le menton et la gorge sont blanchâtres.

Se distingue des autres espèces de Cookilaria par la large marge sombre à l'avant de l'aile. La queue est plus longue par rapport à l'aile que chez le Pétrel de Gould.



Illustration par Douglas H. Pratt © 1987



Répartition et effectifs

L'espèce se rencontre dans le Pacifique Sud où elle occupe une superficie maritime de 35.100.000 km².

Elle se reproduit au Vanuatu (Vanua Lava et éventuellement Gaua dans les îles Banks, Erromango, Tanna et Aneityum) et Fidji (Gau, Kadavu); mais aussi (état actuel inconnu) dans les îles Salomon (Makira), aux Samoa et aux îles Cook (Rarotonga), et dans d'autres îles polynésiennes (Tahiti, Moorea et Raivavae).

La population mondiale est estimée à 670-6700 individus.

Ecologie et reproduction

Les appels de vol comprennent un staccato de "ti-ti-ti", un gémissement bas, un ronronnement bas et un "chir-chir".

La ponte a vraisemblablement lieu après l'arrivée sur les sites de reproduction en octobre, de novembre à décembre.

Statut et conservation

L'espèce a diminué de façon spectaculaire dans son aire historique en raison de la prédation par les mammifères introduits. Les mammifères exotiques envahissants, tels que les chats, continuent d'être la principale menace sur les îles où il subsiste. Comme les autres pétrels du Pacifique, le Pétrel à collier a été exploité pour la nourriture par les communautés locales. Le défrichement des zones boisées pour les activités agricoles et les feux de brousse représentent une menace supplémentaire. L'espèce est classée "vulnérable" au plan mondial par l'UICN.

Sources :

- Thibault, J.-C. & Cibois, A. (2017). Birds of Eastern Polynesia. A biogeographic Atlas. Lynx Edicions, Barcelona
- del Hoyo, J., Collar, N. & Kirwan, G.M. (2017). Collared Petrel (*Pterodroma brevipes*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from <http://www.hbw.com/node/467269> on 8 October 2017).
- BirdLife International. 2016. *Pterodroma brevipes*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697987A93651942. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22697987A93651942.en>.